

FATORES ASSOCIADOS À ADEQUAÇÃO DO PRÉ-NATAL, NO PRIMEIRO NÍVEL, ENTRE ADOLESCENTES NO BRASIL

Bárbara da Costa Campos Dias^{1,2}, Bethânia Oliveira Brito^{1,2},
Isabela Abreu Cutrim^{1,2}, Luiz Claudio Ribeiro^{1,2}

RESUMO

O pré-natal é um importante fator para a redução da morbimortalidade materna e infantil, e o Ministério da Saúde preconiza a gestante ter feito à primeira consulta nos três primeiros meses e durante toda a gestação mais de seis consultas. Verificamos através de uma pesquisa realizada pela PNDS 2006 (Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher), os fatores associados à adequação do pré-natal entre as adolescentes brasileiras. Foram entrevistadas 5843 mulheres, com 20% delas adolescentes, que é o nosso objetivo de estudo. Para estudar o banco de dados, é necessário manuseá-lo com o intuito de saber se o pré-natal foi adequado ou não, assim foi criada a variável adeq1, sendo 0 adequado e 1 inadequado. Depois de diversas análises feitas em todas as mulheres, filtramos o banco de dados de acordo com o nosso estudo, selecionando somente as adolescentes, com uma faixa etária de 12 a 19 anos. É apresentada uma tabela cruzada com o percentual de respostas por categoria dos fatores em função da adequação ao pré-natal, acompanhado do teste Qui-quadrado. Além disso rodamos um modelo de regressão logística, considerando o delineamento amostral para o cálculo dos estimadores, com objetivo de analisarmos os fatores associados à adequação do pré-natal entre adolescentes.

Palavras-chave: *Pré-Natal, Adolescente, Associação.*

¹UFJF-Departamento de Estatística, barbaracosta@ice.ufjf.br, brito.bethania@gmail.com, isabelaabreucutrim@gmail.com, luizclaudio@ice.ufjf.br

²Agradecimento à FAPEMIG pelo apoio financeiro.